

ZALECENIA PO ZABIEGU STERYLIZACJI SUKI

Szanowni Państwo,

Dzisiaj suczka została wysterylizowana. Przez najbliższe **10 dni** będzie musiała być otoczona szczególną uwagą i troską.

Zabieg sterylizacji to operacja na jamie brzusznej, a więc ingerencja w wewnętrzne przestrzenie ciała, gdzie znajdują się narządy. Kilka naszych uwag, oraz odrobina Państwa zaangażowania pozwolą szybko i sprawnie powrócić zwierzakowi do dawnej kondycji.

Dzień zabiegu

Oddajemy Państwu suczkę w pełni wybudzoną, ale proszę pamiętać, że środki narkotyczne jeszcze działają, jej **zachowanie będzie nieco inne niż zwykle**, tzn. może chwiać się na nogach, może mieć problemy z koordynacją, będzie dużo spać, ale może też głośno piszczeć lub wyć (nie wynika to z odczuwanego bólu, ale z halucynogennego działania leków narkotycznych). Może też sprawiać wrażenie, jakby nie mogła sobie znaleźć miejsca.

W dniu zabiegu nie wolno podawać zwierzęciu jedzenia !!!

W dniu sterylizacji zarówno przed, jak i po operacji nie podajemy suczce nic do jedzenia. Może przyjmować jedynie niewielkie ilości wody. Proszę zwrócić uwagę, aby nie zasnęła z głową w misce! Najlepiej samemu dozować jej wodę.

W dniu zabiegu zapewnij swojemu pupilowi ciepło i spokój !!!

Narkoza wyostrza wszystkie zmysły, należy zapewnić zwierzęciu spokojne miejsce, bez głośnej muzyki, ostrego światła itp. Najlepiej ułożyć suczkę na podłodze, w jej ulubionym kocu lub pościu, unikając przeciągów i niskich temperatur. Organizm po zabiegu szybko się wychładza, więc warto umieścić pod pościu termofor z ciepłą wodą.

Może się zdarzyć, że suczka zmoczy dywan, albo pościu - ma prawo być słaba i nie zdążyć zasygnalizować potrzeby. Może też wymiotować, jest to zupełnie normalne, narkoza powoduje nudności, więc może się to zdarzyć kilka razy, nawet jeszcze w drugim dniu po zabiegu.

Drugi dzień po zabiegu

Pierwszy posiłek powinien być lekkostrawny (np. gotowane mięso, sucha karma namoczona w ciepłej wodzie) i podawany w małych porcjach, 3-4 razy dziennie. Jeśli po zjedzeniu posiłku pojawią się wymioty, należy zmniejszyć porcje i odczekać jeszcze 2-3 godziny do następnego podania.

Trzeciego dnia można powoli powracać do zwykłej diety. Proszę nie zapominać, że zwierzęta po sterylizacji mają większe apetyty. Otyłość prowadzi do wielu niebezpiecznych chorób, może warto wybrać karmę dla sterylizowanych suk, lub zmienić dotychczasową dietę na nieco lżejszą.

Zasady, których należy przestrzegać przez 10 dni po zabiegu

Rana chirurgiczna goi się 10 dni, w tym czasie proszę **ograniczyć aktywność zwierzęcia do minimum** (spacery kontrolowane, tylko na smyczy).

Gwałtowne ruchy mogą spowodować zerwanie szwów, a to z kolei powstanie przepukliny brzusznej i zakażeń. W takiej sytuacji pacjentka będzie musiała przejść powtórny operację w narkozie, co znacznie wydłuży rekonwalescencję.

Przez cały okres gojenia się rany suczka powinna chodzić w ubranku. Może jej się to nie podobać, wiele zwierząt nie lubi ubrań, ale po 2-3 dniach powinna się przyzwycząć. Ubranko stanowi ochronę przed zabrudzeniami, ale przede wszystkim zapobiega przed wylizywaniem rany. W 6-7 dniu po zabiegu rana najbardziej swędzi, jest w szczycie gojenia. Wtedy dochodzi najczęściej do wygryzienia szwów.

Kontrole w gabinecie

Pierwsza kontrola odbywa się 2 dni po zabiegu. Lekarz sprawdzi, czy wszystko jest w porządku i poda zastrzyk z antybiotykiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, poda również zastrzyk przeciwbólowy.

Kolejne kontrole mają miejsce w 4 i 6 dniu po zabiegu. Wtedy podawana jest kolejna dawka antybiotyku, który ma zminimalizować ryzyko zakażenia. Jeśli Państwa pupil źle znosi zastrzyki, można poprosić o antybiotyk w tabletkach.

Ostatnia kontrola powinna odbyć się 10 dni po zabiegu, wtedy obcinany jest węzełek przy ranie chirurgicznej, zdejmujemy ubranko i wszystko wraca do normy.

Jeśli w okresie rekonwalescencji pojawiłyby się któreś z poniższych objawów proszę skontaktować się z nami niezwłocznie:

- drgawki
- obfite krwawienie z rany chirurgicznej (niewielka ilość krwistej wydzieliny jest normą)
- utrata przytomności
- brak oddawania moczu do 12 h po zabiegu
- bardzo szybkie oddechy przechodzące w dyszenie
- wymioty podbarwione krwią
- krwista biegunka
- uszkodzenie rany chirurgicznej
- zielonkawy wypływ z rany, o nieprzyjemnym zapachu
- nagle załamanie się samopoczucia

Data zabiegu

Data pierwszej kontroli

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

Przychodnia Weterynaryjna NEOVET w Węgrzcach